

Diphtherie-Impfstoff

Erreger:	Diphtherie-Bakterium
Übertragungsweg:	Tröpfcheninfektion
Inkubationszeit:	Meist zwei bis fünf Tage
Krankheitsverlauf:	Häufige Symptome sind Halsschmerzen, Fieber, Schluckbeschwerden und Schwächegefühl. Später kommen Heiserkeit, Anschwellen des Rachen- und Kehlkopfschleimhaut hinzu. Bei schwerem Verlauf kann es auch zu Atem Problemen bis hin zur Erstickung kommen. Gelangt das Toxin des Bakteriums in den Blutstrom, kann es zu Schäden an Herz, Lunge sowie Nieren kommen.
Immunität nach Erkrankung:	Immunität nicht lebenslänglich
Häufigkeit und Verbreitung:	Weltweites Vorkommen
Impfung empfohlen für:	Standardimpfung für alle, ab dem 2. Lebensmonat
Grundimmunisierung:	Vier Impfungen, 3 im Abstand von einem Monat, die vierte 9-12 Monate nach der ersten
Auffrischimpfung:	Auffrischimpfung mit 5-6 Jahren und 9-16 Jahren, ab 18 Jahren alle 10 Jahre



Diphtherie-Impfstoff

Quellen:

Bilder:

Text: Ommen, Oliver (o.J.): Diphtherie-Impfung bei Kindern URL: <https://www.impfen-info.de/impfempfehlungen/fuer-kinder-0-12-jahre/diphtherie.html>, Aufruf am 15.07.2020

Matzik, Sophie (2020): Diphtherie- Impfung URL: <https://www.netdokter.de/krankheiten/diphtherie/impfung/>, Aufruf am 15.07.2020

Matzik, Sophie (2019): Diphtherie URL: <https://www.netdokter.de/krankheiten/diphtherie/>, Aufruf am 15.07.2020

Bauer, Andrian (2019) Diphtherie URL: <https://www.impfen.de/impfungen/>, Aufruf am 28.07.2020

